

UICC IA low-risk								
Monat	3	6	12	18	24	36	48	60
Anamnese		▲			▲			▲
Informationsgespräch		▲			▲			▲
Klinische Untersuchung		▲			▲			▲
Koloskopie		▲			▲			▲

Im Stadium UICC I ist keine Nachsorge erforderlich, außer nach endoskopischer R0-Abtragung eines pT1 low-risk Karzinoms.

UICC II/III								
Monat	3	6	12	18	24	36	48	60
Anamnese		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Informationsgespräch		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Klinische Untersuchung		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CEA		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Sonografie Abdomen		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Röntgen Thorax in 2 Ebenen			▲		▲	▲	▲	▲
Koloskopie ⁽¹⁾		▲				▲		
Rekto-/Sigmoidoskopie ⁽²⁾		▲	▲	▲	▲			
CT Becken ⁽³⁾	▲							

(1) Wenn präoperativ keine komplette Koloskopie erfolgt ist, wird postoperativ eine komplette Koloskopie nach 6 Monaten empfohlen. Bei unauffälligem Befund nach 36 Monaten nächste Koloskopie in 5 Jahren.

(2) Nur beim Rektumkarzinom ohne neoadjuvante oder adjuvante Radiochemotherapie

(3) Nur beim Rektumkarzinom 3 Monate nach Abschluss der tumorspezifischen Therapie (Operation bzw. adjuvante Strahlen-/Chemotherapie) als Ausgangsbefund.